

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: [facadm16@gmail.com](mailto:facadm16@gmail.com) to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

## **La quatrième semaine du développement embryonnaire**


### **PLAN :**

- I. Introduction.
  
- II. La délimitation de l'embryon:
  - 1. Délimitation longitudinale.
  - 2. Délimitation transversale.
  
- III. La neurulation.
  
- IV. Début de l'organogenèse:
  - 1. Dérivés ectodermiques.
  - 2. Dérivés entodermiques.
  - 3. Dérivés mésodermiques.
  
- V. Mise en place de la circulation fœto-placentaire.
  
- VI. Apparition des bourgeons des membres.
  
- VII. Conclusion.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

## I. INTRODUCTION :

La 4eme semaine du développement embryonnaire survient à partir du 21eme jour, c'est à dire juste après la 3eme semaine laquelle est marquée par un événement fondamental: **LA GASTRULATION**. (Mise en place du disque tridermique).



La 4eme semaine est marquée par:

Deux événements principaux:

- La délimitation de l'embryon.
- La neurulation.

Trois événements « secondaires »:

- Le début de l'organogenèse.
- L'établissement de la circulation foeto-placentaire.
- L'apparition des bourgeons des membres.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

## II. LA DELIMITATION DE L'EMBRYON:


C'est la fermeture de l'embryon et son isolement total des annexes extra-embryonnaires auxquelles il reste attaché par le pédicule embryonnaire: **le cordon ombilical**. Cette délimitation se fait selon 02 axes:

- Délimitation longitudinale.
- Délimitation transversale.

### 1. Délimitation longitudinale :

La cavité amniotique augmente considérablement de volume déborde l'embryon en avant et en arrière. Dans ce mouvement, elle étrangle le lécithocèle secondaire. Par ce processus, on aboutit à un embryon complètement délimité et pédiculisé sur le cordon ombilical. L'étranglement du lécithocèle secondaire sera à l'origine de:

- L'intestin primitif, inclus dans l'embryon.
- La vésicule ombilicale, située à l'extérieur de l'embryon.




### 2. Délimitation transversale :

Le disque tridermique, plat au départ se referme grâce au rapprochement des bords latéraux (droit et gauche) sous l'action du débordement de l'amnios. Ces bords se rejoignent sur la ligne médiane, participent à la fermeture de

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

l'embryon. Au terme des processus de délimitation (transversale et longitudinale), on aboutit à un embryon bien limité baignant dans la cavité amniotique, où on observe une internalisation des feuillet ventraux (entoblaste et mésoblaste) lesquels sont complètement entourés par l'ectoblaste excepté au niveau du pédicule embryonnaire (cordon ombilical).



### III. LA NEURULATION :

C'est la mise en place du neurectoblaste (à l'origine du système nerveux). Elle débute au 18<sup>e</sup> jour et s'achève au 28<sup>e</sup>-29<sup>e</sup> jour du développement.

Elle se déroule en 03 stades:

- C'est à la partie médiane de l'ectoderme qu'apparaît un épaississement: c'est la **plaque neurale** (1<sup>er</sup> stade au 18<sup>e</sup> jour du dvp).

- Cette plaque se creuse en une gouttière: c'est la **gouttière neurale** (2eme stade au 19<sup>e</sup> jour du dvp).


- La gouttière se ferme en tube: c'est le **tube neural** (3eme stade au 21<sup>e</sup> jour) à l'origine du S.N.C.

Les bords de la gouttière neurale s'isolent et forment les crêtes neurales à l'origine du S.N.P.

L'ectoblaste au-dessus rétablie progressivement sa continuité.



UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.





La fermeture du tube neural se fait de manière progressive et bidirectionnelle, elle commence à la partie moyenne de l'embryon vers le 21<sup>e</sup> jour et progresse ensuite vers l'extrémité crâniale et caudale de l'embryon.

N.B: sur un même embryon, les 03 stades coexistent au même moment et à des endroits différents.

Le tube neural restera ouvert au niveau de ses deux extrémités, c'est les neuropores:

- Le neuropore antérieur, au niveau de l'extrémité crâniale, il se fermera au 27-28<sup>e</sup> jour.
- Le neuropore postérieur, au niveau de l'extrémité caudale, il se fermera au 29<sup>e</sup> jour.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.



Représentation schématique en coupe sagittale de la structure d'un embryon de 04 semaines.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.


#### IV. DEBUT DE L'OGANOGENESE :

Très tôt c'est dès la 3<sup>e</sup> semaine et durant la 4<sup>e</sup> semaine du développement, dérivent à partir des 03 feuillets les premières ébauches de nombreux organes.

##### 1. Dérivés ectodermiques :

Certaines zones de l'ectoderme de surface sont le siège d'une importante prolifération cellulaire à l'origine des **placodes** (simples épaissements localisés de l'ectoderme), exemples:

- Les **placodes otiques**, situés au niveau de la région céphalique, donneront le labyrinthe membraneux de l'oreille interne.
- Les **placodes olfactives**, siégeant au niveau de la face antérieure du bourgeon frontal, sont à l'origine de l'épithélium olfactif.
- Les **placodes cristalliniennes**, toujours situés au niveau du bourgeon frontal, à l'origine du cristallin.




##### 2. Dérivés endodermiques :

La mise en place de l'intestin primitif se fait dès la délimitation de l'embryon et comprend 03 régions:



UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

- **L'intestin antérieur:** Fermé en avant par la **membrane pharyngienne**, à son niveau vont apparaître les poches branchiales, le tractus thyroïdienne, les ébauches linguales, la gouttière laryngo-trachéale, les bourgeons pulmonaires, l'œsophage, l'estomac, les bourgeons hépatique et pancréatique dorsal.
- **L'intestin moyen:** communique avec la vésicule ombilicale par le canal vitellin.
- **L'intestin postérieur:** dans lequel s'abouche le diverticule allantoïdien, il constitue le cloaque, fermé en arrière par la membrane cloacale.




### 3. Dérivés mésodermiques (métamérisation) :

Le mésoderme se répartit en 04 régions:

1. **Le mésoderme axial** ou mésoderme chordal: représenté par la notochorde qui régresse en partie et participe à la formation du nucléus pulposus (disque intervertébral)


UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

2. **Le mésoderme para axial:** situé de part et d'autre du tube neural (axe dorsal de l'embryon) se segmente en somites (amas sphériques de cellules mésoblastiques) qui donneront le sclérotome dans la partie ventrale et le dermomyotome dans la partie dorsale. Les somites apparaissent successivement de J20 à J30.



3. **Le mésoderme intermédiaire** ou cordon néphrogène: situé de part et d'autre du mésoblaste para-axial, entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Il se prolonge par le mésoderme latéral.

Il sera à l'origine des nephrotomes (amas de cellules mésoblastiques) qui donnent le mésonéphros ou corps de Wolff (futur rein).



C. T. passant par la région moyenne d'1 embryon humain de 22 jours


UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

4. **Le mésoderme latéral:** constitué par la somatopleure et la splanchnopleure intra embryonnaire tapissant les parois du coelome intra embryonnaire qui est à l'origine des 03 cavités internes de l'embryon et de l'endothélium qui les tapisse:

- \*La cavité péricardique et le péricarde.
- \*La cavité pleurale et la plèvre.
- \*La cavité péritonéale et le péritoine.

#### V. MISE EN PLACE DE LA CIRCULATION FŒTO-PLACENTAIRE :



**La circulation sanguine vitelline:** Le sang arrive par les aortes primitives, circule dans les capillaires de la paroi de la vésicule vitelline et retourne au tube cardiaque (cœur embryonnaire) par les veines vitellines.



**La circulation fœto-placentaire :** s'effectue par les vaisseaux allantoïdiens cheminant dans le cordon ombilical: les deux artères ombilicales, branches de l'aorte, conduisent le sang fœtal du tube cardiaque vers les villosités placentaires et le sang oxygéné revient des villosités placentaires vers le tube

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

cardiaque par les deux veines ombilicales qui fusionnent ultérieurement pour former une veine.



**Coupe transversale d'un cordon ombilical ,2-3<sup>e</sup> mois**




UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE. ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr BOUDIAF, Dr BOUZERIA, Dr BOUGRINA.

## VI. APPARITION DES BOURGEONS DES MEMBRES :

**Les membres supérieurs** apparaissent d'abord, à hauteur des somites correspondant aux futurs niveaux C4 à T2.

**Les membres inférieurs** apparaissent un peu plus tard, à hauteur des somites correspondant aux futurs niveaux L1 à S4.



Photographie d'un embryon de 4-5 semaines.

## VII. CONCLUSION :

La 4<sup>e</sup> semaine du développement embryonnaire marque le début de l'organogenèse. L'embryon est désormais délimité et prend forme, tandis que toutes les ébauches des différents organes sont constituées. La 4<sup>e</sup> semaine est une phase très vulnérable du point de vue tératologique (à cette période de la vie, l'embryon est exposé au risque de malformations).